

* 6/9/2009 : Sortie mycologique à Allagnat (route de Ceyssat)
côté g. i.e. au S. → Ceyssat, puis Montmeyre.
→ route du Puy-de-Bôme : pipie-pipie à
pré ensoleillé.
→ Ceyssat → Olby → la Miouse → Gelles →
Pérol → tourbière de l'Eclache (côté d.).


I Vers Ceyssat:

1) Route de Ceyssat, côté g. (i.e. au S): vers Allagnat:

- amanite vaginée : pied élancé, sans anneau.
- amanite fulva, i.e. fauve : taches rouille sur la volve.
- amanite lividopallescens, i.e. livide : chapeau ocre clair
- cystoderme amianthium.
- bolet fulvérulent : chair jaune → bleu.
- russule mustelina.
- rickenella fibula = omphale fibulée.
- cantharellus amethysteus.
- collybie à pied radicant = oudemaniella redicata.
- mycena florea i.e. à odeur d'iode : chapeau gris brun.
- tubifera ferruginea : myxomycète.
- hypoxylon fragiforme, i.e. en forme de fraise.
- amanite citrine.
- ← - bisporella citrina = hélotie citrine : sporophore jaune.
- ← - polypore varius : base du pied brun noir.
- ← - tremelle mésenterique.
- ← - mycène crocata, i.e. à lait orange.
- ← - mycène amicta, i.e. iris : base du pied bleu vert.
- ← - marasme alliace
- ← - inocybe geophylla, var. lilacina.
- ← - vessie de loup. aquile.
- ← - marasme rotula, i.e. petite roue.
- ← - collybie confluent, entourffée.
- ← - mycène pure.
- ← - polypore géant, i.e. meripilus giganteus.
- ← - gyroporus cyanescens, i.e. bolet indigoier.
- ← - mycène pelianthina, i.e. à arête nolette : odeur de cave.
- ← - mycène ~~ab initio~~.
- ← - xerocomus chrysenteron.
- ← - boletus edulis.
- ← - pholiote changeante = leucophaeomyces mutabilis.
- ← - ? ^{sulfureum}

2) Carrefour de Montmeyre (côté d.):

- clitocybe phaeophtalma, i.e. à odeur de poulailler.
 - flûteé leoninus, i.e. couleur de lion.
 - clitocybe anisé, i.e. odora.
 - collybie personata, i.e. guêtrée.
 - mycène sanguinolenta, i.e. sanguinolente: latex rouge foncé.
 - calocère visqueuse, jaune.
 - fomitopsis pinicola.
 - trame à du sapin, i.e. trichaptum abietinum.
 - chlorociboria aeruginascens: bois coloré en vert par rézige bleu vert.
 - leccinum scaber, i.e. bolet rude (ou reboteux): chair blanche, immuable; sous bouleaux. → leccinum melanopus plus sombre: brun noir.
 - fomes fomentarius = amedouvier.
 - gyroporus castaneus = bolet châtain.
 - cantharellus subpruinosus, i.e. chanterelle pruineuse roussissante: ≈ cibarius, mais se tachant de roux vif.
 - tricholome columbella, i.e. columbette: chapeau blanc, pied blanc parfois vert bleu à la base.
 - guepinia puccina: en cupule orange; sur bouleau.
- dacyrymyces
- ← - collybie conigena: basidiome myosure i.e. collybie queue de rat.
 - flûteé cervinus: odeur de rave.
 - spatularia flava, i.e. jaune.
 - lycogala epidendron.



3°) Route du Puy-de-Dôme, côté g. (i.e. au N):

→ entre Montmeyre et le Puy-de-Dôme: pré ensoleillé → pipie-nique.

- russule gracillima, i.e. très grêle: sous bouleaux.
- lactaire avec souches ++++, couleur carotte: safranée?
- gyroporus castaneus, i.e. bolet châtain, à chapeau brun, pied brun devenant creux.
- marasme des Oreades (= faux mousseron): odeur de foin.
- Russule aeruginosa i.e. vert-de-gris: sous bouleaux.
- scléroderme bovista.
- russule: capilla?