

* 1/6/2009: Sortie Aubrac. R.V. à 10h. à Chaudes-Aigues, place
vers la piscine, à g. à l'entrée de " "
≈ 145 km. → Issire, Massiac, St Flour, Chaudes-
Aigues. Soleil et vent ++; θ limite.

I En direction de Nasbinals:

- bord de route, et pré humide.
- armeria alliacea (= plantaginea): faux plantain.
- benoîte des ruisseaux = œum rivale.
- orchis maculata ssp cordigera (= sambucina), ou tylorhiza maculata: g des bractées violettes, fleurs violettes
- alchémille commune.
- trône d'Europe.
- lychnis fleur de coucou i.e. flos-muculi.
- rénouée bipartite.
- renoncule acré = bouton d'or.
- carex nigra.
- brize intermédiaire.
- sexifrage granulée.
- raïjonce oriculaire.
- raïfance en épis = phytuma spicatum.
- myosotis des champs.
- genêt à balais = cytisus scoparius.
- pênois des Alpes = meum athamanticum.
- balai des frères: fleur jaune.
- viticorne commune.
- trèfle des pés.
- joue effusus?
- penaetia dipsacifolia (= sylvatica)
- vicia cracca = vesce cracca.
- viola tricolor = pensée sauvage.
- rhinanthus crête de coq.
- marquise commune = leucanthemum vulgare.
- lioulique laîcheuse.
- euphrate officinale = casse-lunettes
- géranium des Pyrénées.
- euphorbe dulcis.
- véronique persica.
- avoine élévée: épillets brillants, arête coudée.
- bugle rampante.
- lamier blanc.
- armoise commune.
- achillée millefeuilles.
- fruit sec i.e. capsule solitaire sur g de tige → fritillaria meleagris = fritillaire fintade; graine aplatie, triangulaire



graine.

II En direction du plateau de l'Aubrac:

1^e) Bord de route:

- pique-nique en bord de route, "au milieu" des genêts.
- lupin : non fleuri.
- scrophulaire : non fleurie.
- épilobe en épi: "
- sénégan à feuilles d'Adonis = *Senecio adonisfolius*, feuilles très fines et découpées; non fleuri; fleurs toutes ^(c'est) _{toutefois} en tube.
- sauge des bois = *Teucrium scorodonia*.
- gaillet croisette.
- *sedum telephium*.
- silène enflé.
- *sedum reflexum* (= rupestre).
- céraiste des champs, avec pétales échantrés blancs; plante duveteuse +.
- sénégan *spathulæfolius*, paraitre; grande taille; fleurs avec ligules, ou sans, jaunes.
- orchis pyramidal.
- saignisorbe pimprenelle.
- cardamine des prés.
- campanule rouge.
- genêt purgatif.



2^e) Vers le sommet:

- landes, vaches → 1000m: O₂ ++
- potentille tormentille: 4 pétales jaunes (et non 5).
- passerage *heterophyllum* i.e. 2 feuilles ≠.
- feuilles de tulipe (à fleurs jaunes).
- pissenlit.
- narcisse des poètes = herbe à la Vierge.
- *erodium cicutarium* = bec de grue.
- anthisque sylvestre: ombellifère à petites fleurs blanches, tige creuse. = cerfeuil sauvage.
- par ordre de floraison (ombellifères ~):
 - ① anthisque sylvestre = *anthriscus sylvestris*....
 - ② *chaerophyllum temulum* = cerfeuil penché; tige pleine, pourprée (macules).
 - ③ *tonilis faux-cerfeuil* = *tonilis anthriscus* (= japonica?)
- vérâtre blanc.
- gentiane jaune.
- carline acaule: non fleurie.
- orchidée à fleurs blanche jaune = *orchis sambucina*, i.e. orchis sureau.
- orchis ♂.
- marasme de l'oréade.

III Retour par ?

- bord de route et bâtière de forêt.
- stelleire holostée.
- conopode dénudé.
- myrtille = vaccinium myrtillus.
- genet poilu.
- callune commune.
- gaillet blanc, petit = galium pectabile, i.e. des rochers.
- renoncule à feuilles d'aconit.
- orchis or : fleurs roses.
- prête.
- euphorbe d'Irlande = euphorbia hiberna.
- centaurée jacobée : en bouton.
- centaurée noire ≈ centaurée jacobée, mais bractées noires.
- maianthème à 2 feuilles.
- gée composée jaune, non fleurie : doronic d'Autriche.
- scléranthe vivace.
- cirsé lancéolé.
- gaillet vrai, en bouton : fleurs jaunes, tige ronde.
- petite labiée à fleurs bleues avec tache blanche : scinax arvensis i.e. sarriette des champs.
- ...

IV Chenilles :

- chrysalide sur feuille de plantain : parasitée par ichneumon intidius (la chrysalide brunissait en cours d'évolution).
- chenille velue → mue ; très gourmande (feuilles de pinsonlit acceptées et dévorées).
= lasiocampa quercus, i.e. minime à bandes jaunes
(= bombyx).