

* 24/8/2014: Sortie mycologique au col de la charme et au sud de St Priest la Prugne (tourner à d. au St Priest, →

- Christian Hurtado
- Nicole Guzon

chemin de terre → bois de pins: "la France"; continuer jusqu'à Bois Vallas, vers carrière; retour sur route de St Priest). Repas au col de la charme: ^{si pluie soleil + → -}

I Col de la charme: côté E (tourbières)



1°) Champignons:

- corinaire sanguineus.
- rusule adusta, i.e. brûlée: blanche → brun rouge; odeur de vieux fût.
- corinaire sub-tortus.
- boletus calopus.
- amanite spissa: odeur de rave.
- corinaire sub-crassus.
- corinaire limonium, i.e. citrin. lames jaune ocre → jaune rouille
- corinaire paleaceus, i.e. pailleté: odeur de pélargonium.
- chanterelle tubaeformis, avec plis fourchus gris.
- Leucogonium luteo-alba: jaune. = pezizaeformis.
- lactaire trivialis i.e. commun: chapeau de couleur variable.
- amanite rubescens, i.e. golmothe.
- polypore éclatant i.e. pycnoporellus fulgens: sur bois de conifères.
- rogites cajeratus i.e. pholiote ridée: chapeau jaune roux.
- tylopilus felleus i.e. bolet de fiel.
- boletus erythropus.
- xerocomus chrysenteron i.e. bolet à chair jaune.
- polypore pes-caprae, i.e. albatrellus pied de chèvre.
- hydne ferrugineux? scrabioculé?
- Sparassia laminosa i.e. clavaire à lames.
- amanite muscaria, i.e. tue-mouches.
- amanite citrina.
- amanite fulva: fauve.
- amanite porphyria, i.e. porphyre.
- amanite virosa.
- amanite spissa, var. excelsa: odeur de gant de toilette.
- amanite umbrinolutes: chapeau brun gris à cerne brun. sous conifères de montagne?
- calocère visqueuse, i.e. viscosa.
- léotie lubrica.
- lactaire lignyotus, i.e. couleur de suie.
- lactaire rufus, i.e. roux: mamelon pointu, latex blanc.
- lactaire plumbeus = necator = turpis, i.e. plombé: chapeau brun olive.
- lactaire pergamenus i.e. parcheminé: chapeau bosselé → crème roux; chair → vert de gris?
- lactaire tabidus, i.e. déperissant.
- lactaire salmonicolor i.e. saumon: sous sapins.
- lactaire vietus, i.e. fauve: latex blanc → gris vert.
- lactaire vellereus, i.e. velouté: lames blanches, espacées.
- jaxille involutus, i.e. enroulé: odeur de caoutchouc.
- rusule ochroleuca.
- rusule pseudo-raoulhi: chapeau jaune citron → crème.

①

- russule caipex i.e. à pied creux; chapeau rose violacé; odeur de safran.
- russule de Turco i.e. turci \approx russula amethystina: lilas violacé; odeur d'iode à la base du pied.
- russule nigricans i.e. noircissante: lames très espacées; rougit puis noircit; odeur fruitée.
- russule badia: chapeau pourpre; odeur de bois de cèdre.
- russule integra i.e. intégrale.
- russule lapeticola i.e. émétique du liège.
- russule epusa.
- russule ~~colobota~~ ~~sp. nov.~~ ~~?~~ ~~colobota~~
- lactaire albocarneus = glutinosus: pâle et gluant; chapeau visqueux.
- Mcollybie platyphylla i.e. à lames larges.
- chrysomphalina chrysophylla i.e. clitocybe à lames jaune d'or.
- xeromphalina campanella i.e. omphale clochette.
- clitopile prunulus i.e. meunier.
- entolome nidorosum (rhodopolium) i.e. nitreux; odeur de fœvel.
- galère badipes \approx galère marginée: pied noir à la base, anneau fragile, basides bisporées.
- hydne repandum.
- nicholome pseudonictitans.
- phallus impudicus.
- chanterelle lutescens: hyménophore jaune pâle, lisse à veiné.
- corinaire laniger i.e. laineux: sous conifères de montagne.
- corinaire camphoratus.
- corinaire brunneus: chapeau brun sombre; sous épicéas de montagne.
- corinaire levernus i.e. abondant: brun lilacin. \approx scutulatus (odeur de radis)
- corinaire malicorius i.e. à chair verte.
- leucocorinaire bulbiper i.e. bulbeux: lames blanches.
- corinaire speciosissimus = rubellus: très joli: \bar{o} forêt humide de conifères (sphaignes, mousses, myrtille).
- laccaria amethystina.
- laccaria laccata.
- corinaire integerrimus i.e. stiletikus: chapeau miel, pied violet. ^{sous corinaires}
- oligoporus caesius i.e. polypore bleuâtre.
- mycène zephyra i.e. zéphyr.
- mycène galopus i.e. à lait blanc.
- collybie maculata i.e. tachetée: chapeau blanc à taches brunes ^{rouille}
- collybie distorta i.e. torsadée: chapeau brun roux.
- inoctbe lanuginosa i.e. laineux.
- flammula penetrans (= gymnopilus): fauve à taches rouille.
- gymnopilus hybridus i.e. intermédiaire: $\bar{\bar{f}}$ tache rouille.
- hypholome fasciculare i.e. en touffes.
- hébelome ^{lequel?}
- tremelle gélatineuse i.e. pseudohydnum gelatinosum.
- pholiote astragalina i.e. chardonneret.
- tricholome décora i.e. tricholome décoré.
- clavaire cristata i.e. crêtée: ramaria ou clavulina cristata: sporome blanc avec ramifications terminées par $\bar{p}^{\bar{e}}$ aiguës (conrète)

- ramaria larentii, i.e. clavaire de l'argent : rameaux jaune orangé.
- lycopodon perlatum i.e. vessie de loup perlée.
- lycopodon nigrescens i.e. " " " noircissante : aiguilles brun → noir.
- lactaire blunius, i.e. mupueux : var. viridis (= forme vireuse); chapeau gris vert pâle.

20) Mousses:

- mnium hornum, avec feuilles effilées et gamétanges terminaux.
- plagiomnium affine, avec dents à bords des feuilles. = mnium affine.
- lufocornium splendens
- hypnum cupressiforme : forme filiforme.
- hépatique
 - scapania nemorosa avec anthéridiophores.
 - calypogeia muelleriana.
- sphaigne
 - sphagnum magellanicum, avec capitulum proéminent rose vert; plante vigoureuse.
 - sphagnum angustifolium, plus fine, avec capsules en formation en forme d'urnes brun rouge, sur pseudopodes vert. pâle.

39) Lichens:

- cladonia furcata : thalle dressé, vert pâle.
- bryoria fuscescens : thalle en barbe, brun foncé, avec petites soralies blanc bleuâtre. = alectoria.
- cladonia floerkeana : scyphes "formées par apothécies".

→ pin Weymouth: feuille à 5 aiguilles.

II Au Sud de St Priest-la-Prugne:

10) Bois de pins: à d., puis à g. (i.e. à l'O, puis à l'E):

a) Champignons:

- suillus bovinus = bolet des bouviers.
- corinaire laniger.
- aménite fulva.
- gymnopilus liquoritiae, i.e. à chair jaune.
- corinaire traganus, var. finitimus sous conifères de montagnes.
- corinaire lignyotus, i.e. couleur de miel.
- cantharellus cibarius.
- amanite spissa, var. excelsa.

- psixille atrotomentosus; i.e. à pied velouté.
- russule badia, très âcre, à chapeau pourpre; odeur de bois de cèdre, de crayon.
- corinaire integerrimus (= stillatus); odeur de miel.
- russule sardonis: lames crème citrin.
- amanite virosa: très nombreuses.
- corinaire limonium.
- hydrellum ferrugineum i.e. hydne ferrugineux.
- russule virescens, i.e. verdoyante: vert amande, vite crapulée; saveur de noisette.
- amanite muscaria.
- amanite jonquilles, ou gemmatq.
- suillus variegatus, i.e. mouche; tubes brun olive.
- Boletus edulis.
- boletus calopus.
- boletus erythropus.
- xerocomus badius, i.e. bolet bai.
- cantharellus tubaeformis.
- corinaire sanguineus.
- Fomitopsis pinicola.
- lypholome fasciculare.
- laccaria amethystina.
- pomphale perforans ≡ marasme perforans.
- pycnoporellus fulgens i.e. polypore éclatant.

b) Mousses:

- dicranum scoparium.
- hypnum cupressiforme.

c) lichens:

- phlyctis argens: thalle crustacé sur écorce d'arbre, gris clair, à bords argentés.
- cladonia furcata.
- pseudoevernia furfuracea: thalle en lanières, avec face inf. noire.
- cladonia floerkeana.

2°) Bois Vallas: côté d. → feuillus et conifères.

- corinaire holaris.
- corinaire traganus: odeur de bouc.
- corinaire camphoratus.
- corinaire 1/2 sanguineus.
- corinaire purpurascens: chapeau brun, lames lilacin → brun violet, pied ± violet.
- russule fellaa i.e. de fiel: ocre fauve.
- russule nigricans.
- russule ochroleuca.
- russule densifolia i.e. à lames serrées.

- russule amethystina = turci.
- lactaire plombeus = necator, turpis.
- lactaire blennius.
- lactaire quietus, i.e. tranquille : brun roux.
- trichomolopsis decora.
- gymnopilus picreus : chapeau brun cannelle pruineux et mat, pied → noir brun à la base. ≠ gymnopilus liquiritiae var. satur.
- corinaire albo-violaceus.
- tricholome virgatum i.e. vergé : gris argenté.
- tricholome viridilutescens : chapeau jaune vert, lames blanches.
- tricholome ustale, i.e. brûlé : chapeau brun roux.
- amanite rubescens i.e. gelmothe.
- bankera fuliginosa, ô pins : espèce hydnoïde.
- russule papahicola.
- phallus invidicus.
- xerocomus pruinatus i.e. pruineux : brun foncé.
- lactaire camphoratus.
- microporus cinnabarinus, i.e. polypore rouge cinabre.

✦ lichens lépreux sur sapin : ≈ "poussière".