

« 25/8/2013 : Sortie mycologique au col de la Charme et au
Gué de la Chaux. Repas à l'école de S: Priest la
Prugne.

André Huetado
Nicole

I Col de la Charme:

→ mise en commun

1°) Bolets:

- boletus calopus.
- boletus fellens
- xerocomus badius.
- xerocomus chrysenteron.
- boletus erythropus.
- boletus edulis.
- leccinum holopus, i.e. bolet blanc des sphaignes (sous les bouleaux).
- xerocomus eisalpinus : bleuissement intense à base du pied; = chrysenteron.

2°) Amanites:

- amanita virata.
- amanita rubescens.
- amanita excelsa (spissa, si odeur de rave).
- amanita crocea.
- amanita fulva.
- amanita dumbrinolutes : chapeau brun gris; sous conifères de montagne.
- amanita citrina, var. alba.

3°) Corinaires:

- corinaire speciosissimus
- corinaire sub-tortus
- corinaire camphoratus
- corinaire evernins, i.e. abondant: brun violet.
- corinaire sanguineus
- corinaire brunneus
- corinaire pseudo-crassus : couleur caramel.
- corinaire stillatitius : odeur de miel à base du pied, chapeau brun ocre, pied violacé clair. = integerrimus.

4°) Lactaires:

- lactaire piperatus.
- lactaire necator i.e. turpis : sous bouleaux et épicéas.
- lactaire tabidus.
- lactaire camphoratus : odeur de chicorée.

5°) Russules:

- russula laurocerasi, i.e. à odeur agréable.
- russula chloroides.
- russula ochroleuca.
- russula integra, forme purpurella.
- russula badia.
- russula emetica.
- russula paludosa.
- russula amethystina.
- russula vesca, i.e. comestible.
- russula dentifolia, i.e. à lames serrées.

6°) Trivers:

- Mcollybia platyphylla.
- inocybe lanuginosa
- tricholomopsis decora
- hydnum repandum
- cantharellus cibarius
- pholiota flammans
- pluteus satur, i.e. plutee saturé.
- polypore du bouleau

- hymenochaete cruenta (= rubiginosa): croûte ^{rouge} sur bois mort de ^{type} E aphylloromycètes?
- croûte blanche = ?
- schizopora paradoxa: croûte blanche résupinée.

II Gué de la Chaux:

1°) Côté E (parking):

- lemitopsis pinicola
- russula aeruginea
- lactaire representaneus
- lactaire trivialis
- lactaire helvus
- cortinaire ectypus.
- plutee: le quel?
- entoloma nidoropum
- cortinaire speciosissimus
- russule betularum (émétique)
- gloeophyllum odoratum.
- laccaria laccata.

- chalciporus piperatus, i.e. bolet poivré.
- fuligo sephica: jaune.
-

2°) Côté O (tourbière):

- russula claroflava: chapeau jaune clair.
- corinaire skellatius (= integerrimus).
- corinaire cinnamomeus.
- russula cavipes
- russula aquosa
- plutee murina?
- chrysomphalina chrysophylla.
- galère paludosa.
- corinaire sub-tortus.
-