

28/18/2011 : Sortie mycologique au col de la Charme et au
Gué de la Charrière. Repas à l'école de
Prést la Prugne. ⇒ ≠ groupes.

I Col de la Charme:

1) Bois à l'E (de la route):

= Bois Noirs.

- cortinaire laniger, avec cortine et anneau membraneux;
≈ bivelus (→ sous bouleaux); laniger pousse sous les
épicéas.
- cortinaire sub-tortus: lames ^{bleu} gris-olive; odeur de bois
de cèdre, de cuir de Russie; chapeau fauve vert.
- tricholome pseudo-nichitans: chapeau roux, chair
jaune en surface.
≈ tricholome fulvum: chapeau brun roux, lames jau-
nes (ocre), chair jaune.
- cortinaire malicorius: chair verte.
- cortinaire camphoratus: chair violette partout; odeur
de bouc, de corne brûlée.
- mollisia cinerea, i.e. mollisie cendrée: ≈ pezize grise.
tricomycète.
- russulé grisescens, émélique grisonnante: chapeau
rouge, pied blanc → gris.
- mycène epipterygia: pied jaune, visqueux; lames pâ-
les. chapeau = gris pâle. = mycène des fougères.
- laccaria laccata.
- amanite rubescens.
- mycena galopus, i.e. à lait blanc.
- cortinaire evernius, i.e. abondant: chapeau brun
violet; pied voilé de blanc; lames larges brun vio-
let.
- cortinaire croceus, i.e. safran: lames jaune safran.
(sous-genre dermocybe)
- cortinaire azureo-velatus, i.e. bleu et voilé: lames
lilas; chapeau gris-bleu (→ brun au centre); pied avec
voile jaune à chinures.
≈ anomalus.
- marasme androsaceus: chapeau brun rose; pied
noir (≡ soie de sanglier); peu d'odeur; sur ai-
guilles et cônes de conifères.
- marasme perforans, sur aiguille de conifères
(épicéas ++); odeur de chou pourri.
- cortinaire pseudo-austrius: une seule lamelle
large, blanche, au centre du chapeau.
- laccaria ametluytina.
- cortinaire interprimus = stiletinus: pied et chapeau
visqueux; odeur de miel. Sous-genre myxacium.
- alnicola scolecina, i.e. alnicole sombre: brun
rouge. ∈ Hébelome. Sous les aulnes.
- cortinaire flexipes, i.e. palasaceus = pailleté: chapeau
brun ocre violacé; voile blanc; odeur de palarponium.
- ★ cortinaire paleifer: brun violet; lames peu serrées;
base lilas.
- pezize badia: brune.
- entoloma rhodopolium: sans odeur.
- cortinaire fulvoochraceus: chapeau fauve, lames
lavande, pied bulbeux.



- *inocybe geophylla* var. *lilacina* : chapeau lilacine ; pied ocre jaune ; pied lilac pâle.
- *corinaire acutus*, i.e. aigu : en bonnet de lutin avec mamelon pointu
- *lactaire tabidus* i.e. déprimant : chapeau orange ocre ; pied pâle, vite creux ; lait blanc → jaune sur mouchoir, par oxydation.
- *amanite muscaria*, i.e. tue-mouches.
- *calocera viscosa*, jaune orangé.
- *cystoderma amianthinum*, i.e. furfuracé ; chapeau ocre jaune orange ; odeur de terre, de moisi.
= *cystoderma jasonis* : chapeau brun ocre. = inodore.
= *cystoderma granulorum* : chapeau brun roux ; = inodore.
- *fensjonia luteo alba* : partie sup. jaune, partie inf. blanche. = *fensjonia pegizaeformis*.
- *russule pseudo-raculi* : chapeau jaune → crème.
- *corinaire bolaris*.
- *corinaire speciosissimus*.
- *amanite pennata* = *junquillea* : chapeau ocre, jaune à vertues blanches ; volve blanche très serrée.
- *corinaire semisanguineus*.
- *corinaire sanguineus*.
- *fuligo repica*.
- *Heolhytie platyphylla* ; sur racines ou souches enfouies.
- *galerna marginata*.
- *amanite spissa* : odeur de rave.
- *corinaire limonium* : chair jaune.
- *cordyceps* sur guêpe : filaments blancs. *Endycus ditina*

20) Mite en commun à l'école :

- *amanite phalloïde*.
- *amanite spissa* var. *excelsa* ; ≠ *amanite porphyria*, qui a un anneau membraneux et une odeur de rave.
- *amanite citrine* var. *alba* : odeur de patate crue.
- *amanite fulva*, i.e. *amanitopsis* car ≠ anneau.
- *russule ochroleuca*.
- *russule amethystina*, i.e. turci ; chapeau visqueux avec humidité → mat par temps sec ; pied à odeur d'iode
- *russule violeipes* (= à pied violet) var. *amara* (= veloutée) ; odeur de topinambour.
- *russule violeipes* forme *citrina* ; chapeau jaune ; odeur d'artichaut.
- *russule silvestris*, émélique des chênes (= *russula betularum*) ; chapeau rose pastel.
- *russule fageticola*.
- *russule cyanoxantha*.
- *russule acrifolia* : noircissante.
- *russule grisea*, i.e. grise ; chapeau gris bleu ; la chair rose.
- *russule praetervisa* (= *pectinatoides*), i.e. à odeur de baudruche ; chapeau brun ocre. ∈ *russules fétides*.

- *lectaire nivialis*.
- *lectaire plumbeus* = *necator* = turpis, i.e. plombé.
- *tricholome sejunctum*, i.e. disjoint : chapeau jaune olive; pied blanc (jaune).
- *collybie maculata*, i.e. tachetée : chapeau blanc → taches rouille; lames blanches très serrées.
- *collybie cirrhata* i.e. filiforme : blanche; base feutrée; \neq sclérote (au contraire de *collybia tuberosa*).
- *collybie peronata* (ou *marasme*), i.e. guêtrée : poils jaunés à la base du pied.
- *pholiota flammans*, i.e. incandescente : jaune orange.
- *gymnopilus penetrans*, i.e. flammule pénétrante.
= *gymnopilus hybridus*, i.e. intermédiaire.
- *entoloma lividum*, i.e. livide : lames jaunes → rose; odeur de farine.
- *entolome rhodopolium* forme *nidorosum*, i.e. nitreux; odeur de Tavel.
- *inocybe napipes* i.e. à bulbe en navet.
- *inocybe eustrix* \approx *calamistrata* : peu à pas de teinte verte à la base du pied.
- *clitocybe clavipes* i.e. à pied clavé.
- *mycenä renatii* = *flavipes* = *luteoalcalina*, i.e. à pied jaune.
- *corinaire purpurascens* i.e. purpurescent : chapeau brun, lames lilacin → brun violet, pied violeté.
- *corinaire brunneus* : chapeau brun foncé.
- *corinaire torulosus* \approx *bicolor* : odeur faible.
- *corinaire collinitus*, i.e. enduit.
- *hydne repandum*.
- *boletus calopus*.
- *tylopilus fellous*.
- *xerocomus badius*, i.e. bolet bai.
- *fomitopsis pinicola* (= polypore marginé) : amadouier des pins.
- *gymnopilus liquiritiae*, i.e. à chair jaune : chapeau brun rouge, et pied; lames jaune vif.

II Gué de la Chaux:

→ groupe tourbière : côté 0.

- *russula betularum* (émétique) : chapeau rose pastel.
- *laccaria laccata*.
- *corinaire obtusus*, i.e. obtus : chapeau brun; odeur d'iode.
- *mycène galericulata*, i.e. en cespue : crème, saveur farineuse; sur souches de feuillus (i.e. lignicole).
- *mycène sanguinolenta*, i.e. sanguinolente : chapeau ocre rose; lames blanches à arête rouge; lait rouge foncé.
- *entolome rhodopolium* forme *nidorosum*.

Hydnum patopus.
 corinaire *speciosissimus*.
 russule *apurosa*: rose.
 corinaire *integerrimus*.
 corinaire *paleifer*
 russule *griseascens*
Galerina paludosa: silhouette élancée, voile blanc
 fibrilleux ++; $\bar{\sigma}$ sphaériques.
 russule *betularum* (émétique): chapeau rose pastel.
 lactaire *rufus*, i.e. roux: lait blanc.
 amanite *vaginata*, i.e. vaginée: chapeau gris ocre à
 marge striée; pied élancé, sans anneau; volve allon-
 gée, engainante, blanche.
 lactaire *vietus*, i.e. fané: chapeau gris brun; lait blanc
 → gris vert.
 hypholome *elongatum*: petit chapeau ocre crème; pied
 ocre → brun à la base.
 russule *sphagnophila*.
 lactaire *helvus*, i.e. à odeur de chicorée^{de celeri (Maggi)}: chapeau
 fauve, velouté; lait aqueux; lames, crème; chair ocre^{pâle}.
 lactaire *camphoratus*, i.e. camphré: chapeau brun
 roux; lames ocre vineux; odeur de chicorée; chair
 brun vineux.
 russule *emetica*, i.e. émétique: chapeau rouge vif.
 corinaire *cinnamomeus*, i.e. cannelle: chapeau brun,
 lames cannelle orange.
 corinaire *laniger*, i.e. laineux: sous les épicéas.
 = corinaire *bivelus*: sous les bouleaux.
Helephora terrestris.
Pholiota mutabilis = *kuehnomyces mutabilis*, i.e.
 pholiote changeante (apric à soupe).
 russule émétique var. *longipes*: disque très sombre,
 pied long. = *clavio-brunnei*?
Omphalina sphagnicola, i.e. omphale des sphaignes:
 lames décurrentes; spores pâles; chapeau gris ocre
 pâle. = petit ditocybe.
 corinaire *brunneus*: brun.

lichens - *Peltigera canina*
 - *Cladonia coccifera*

→ 2^e groupe: côté E