

* S 19/5/2018 : → Sortie moussees du Conseil Général. RV:

- Christian
- Françoise
- Maurice

- 10h à la maison de la Comte: SMBLA.
 - 14h " " " " " : néophytes.
 ⇒ Sortie, puis pscopie.

I Sortie du matin (10h): chemin à l'O, vers ruisseau:

1^o) Sortie:

- Allium ursinum: en fruits.
- Paris quadrifolia i.e. planisette à 4 feuilles.
- Lamium galeobdolon i.e. lamier jaune: fleurs jaunes à 2 lèvres.
- Plagiodila asplenoides: hépatique.
- Fissidens taxifolius.
- Fontinalis antipyretica.
- Porella platyphylla.
- Frullania dilatata.
- Metzgeria furcata.
- Radula complanata.
- Lilium martagon i.e. lis martagon.
- Milium effusum i.e. millet diffus.
- fissidens: lequel? très petit.
- Brachythecium rutabulum.
- Euphorbia amygdaloides i.e. euphorbe des bois: rosette perçée tige à base dénudée et rougeâtre; capsule lisse.
- Leucodon sciuroides.
- Orthotrichum affine: sur feuilles.
- Neottia nidus-avis i.e. néottie nid d'oiseau (racines charnues).
- Mnium hornum.
- Ajuga genevensis, i.e. bugle de Genève: fleurs bleu intense groupées en glomérules.
- Anomodon rostratus?
- Scutellaria scutellata i.e. scutellarie petite coupe: ascomycète avec sporocème en disque orange à marge hérissée de cils bruns; sur débris ligneux.
- Phyteuma spicatum i.e. raiponce en épis: épis de fleurs blanches (ou bleues, ou + jaunes); feuilles basales en cœur, maculées de noir.
- prêle d'hiver i.e. Equisetum hyemale: tiges striées, vert foncé. non ramifiées.
- Veronica chamaedrys i.e. véronique petit chêne: grappes axillaires de fleurs bleu azur; capsule en cœur; tige avec 2 lignes de poils, opposées.
- Campylium stellatum: aspect en étoile (vue de dessus).
-

2^o) Pipre - nippé à l'ext.

3^o) Pscopie:

II Sortie de l'ap. midi (14h) :

1^o) Petit film sur mousse:

→ notions générales.

2^o) Sortie côté E : bois derrière parking, puis allée côté E → ruisseau :

- ceratodon purpureus.

- bryum argenteum.

- Grimmia chamaedrys i.e. vénérable petit chêne (fausse germandrée).

- sorbus terminalis i.e. alisier terminal : ⇒ alisier i.e. drupes brunes verruqueuses.

- hypnum cupressiforme var. filiforme.

- frullania dilatata.

- adula complanata.

- geranium nodosum i.e. geranium nouveau : pds fleurs mauve veinées de violet.

- melica uniflora i.e. mélisque uniflore : épillet à 1 seule fleur.

- orthotrichum : lequel ?

- thuidium tamariscinum.

- felugo sephica : plasmode jaune. Union d'une amibe et d'un champignon.

- Rhamnobryum alopecurum : mousse pleurocarpe.

- brachythecium rutabulum.

- hypnum cypresiforme var. filiforme : # nervure à feuilles.

- alliaire pétiolée i.e. alliaire pétiolata : crucifère à o-deux d'ail.

- valériane : officinale ? diopique ?

- minium affine.

- rhizocladellus triquetus.

- plagiomnium undulatum.

- minium hornum.

- polygonatum multiflorum i.e. scou de Selomon multifl. fl.

- arctium lappa i.e. pde bardane : grosse rosette de g des feuilles ovales, capitules à involucre globuleux avec bractées linéaires terminées en crochet.

section → V ← - fontinalis antipyretica : feuille carénée.

- metzgeria furcata.

- strichum undulatum.

- hypholoma fasciculare i.e. hypholome en touffes.

- (Cibosermum purpuro-caeruleum i.e. prémil rouge bleu.

- lylocomium splendens, i.e. mousse à étages.

- kindbergia praelonga.

- dicranum scoparium.

- ...

3^o) Retour à la maison forestière et microscope.