

25/10/2014 : Sortie mycologique en forêt de la Courte. RV 14h à la maison forestière. → côté E

- Christian Hurtado
- Marcel Payrot

I Explications sur champignons.

II Sur le terrain: côté E (maison forestière):

- lactaire velleterus.
- mycène pura.
- russule delica, i.e. sans lait; odeur de hareng; chapeau blanc crème souille de terre; lames assez espacées.
- polypore bleutâtre i.e. oligoporus caesius.
- lactaire rufus: graineton pointu.
- verre de loup perles i.e. lygoperdon perlatum.
- lactaire salmonicolor
- amanitopsis fulva: chapeau brun.
- strophaire cherulea.
- hypholome fasciulare.
- inocybe geophylla: blanc.
- leucocortinaire bulbiger: lames blanches.
- lygrophore pudorinus
- russule fellea: chapeau ocre.
- russule parasitée par mycelis parasitica.
- agaric: pied.
- mycène: pied.
- inocybe geophylla var. lilacea.
- clavaire pâle i.e. ramaria pallida: ramifications en V; crème → brun.
- tricholome usponaceum.
- cortinaire dibaphus i.e. à 2 couleurs: pilosin → ocre.
- lactaire laccata.
- galère marginée.
- lactaire quietus, i.e. tranquille: ocre roux; odeur de pin ou de bois; sous chênes.
- lactaire chrysotrichus: lait blanc → jaune d'or; sous chênes surtout.
- ≡ - russule fragilis i.e. fragile: rose violet; odeur de "bonbon anglais"; arête des lames dentelée (loupe).
- lepista nuda i.e. pied bleu.
- armillaire mellea: odeur et couleur de miel.
- armillaire ostoyae i.e. obscure: anneau blanc.
- lépiote mastoïdea (= richenii), i.e. mainelonnée.
- russule: pied noir.
- hydne repandum.
- lactaire serifluus, i.e. à lait séreux: chapeau brun, pied plus pâle.
- amante pantherina: verrues blanches sur cercles concentriques.
- crépidote mollis: ≈ calolepis, mais sans squames.
- lygrophore blanc, visqueux: discolorans.

(2)

- craterellus cornucopioides i.e. trompette des morts.
- hygrophore russula, i.e. vinaigrier : blanc rose vineux.
- myxomycète blanc.

III Petite exposition de champignons:

- cordyceps capitata i.e. cordyceps à tête : parasite truffe des cerfs i.e. champignon hypogé du genre elaphomyces.
- lactaire helvus, i.e. à odeur de chicorée ; lait aqueux.
- lactaire glyciosmus, i.e. à odeur suave : odeur de noix de coco.
- parasite involutus, i.e. enroulé.
- amanite rubescens i.e. golmotte : chapeau brun vineux.
- bolet erythropus.
- tricholome terreum, i.e. terreaux (petit gris) : pas d'odeur de farine ; sous pins surtout ; lames gris pâle.
- calotère viscosa.
- corticaire phoeniceus : rouge écarlate ; lames rouge sang. Taille > cortinaire sanguineus.
- corticaire torvus, i.e. à pied courbe : brun gris, soyeux. Lames espacées, armille lisse avec anneaux membraneux. Sous hêtres surtout.
- russule sardonia i.e. sardoine : chapeau pourpre violacé ; lames crème citrin ; sous pins.