

* 30/10/2020 : Sortie mycologique en forêt de la Comté (conseil général). côté E (vers maison forestière), puis traversée de la route → côté O, vers étang, et retour par le bois. R.V. id4th.

- hygrophore judibond.
- *Mycetidia cucumis*
- pseudo-clitocybe cyathiformis
- mycène polygramma, i.e. à pied strié.
- lepiote ventriosospora, i.e. à spores ventrues ; marge appen-
dielle 2
- lepiote clypeolaria, i.e. en bouclier.
 ⇒ pied séparable ; lames blanches, libres.
- entolome nidoratum.
- lactaire salmonicolor : parasité par hypomyces ochraceus.
- cystoderme carcharias, i.e. à dents de repous : chapeau blanc rosé à marge frangée, lames blanches, pied blanc avec armille granuleuse ; odeur terreuse.
- hypholome fasciculare.
- gymnopilus hybridus, i.e. intermédiaire (= flammule) : cha-
peau ocre roux, lames jaunes vif, pied avec zone
annulaire ≡ cortine.
- colocère viscosa, jaune orange, gélatineuse : ≡ champignon chinois très apprécié en Chine.
- xylaire hypoxylon.
- incycle geoplylla : var. lilacina : var. violacea.
- lepiota nuda = pied bleu, tricholome nu : chapeau lilac, lames tij bleu-lilas ; pied violet clair ; spore blanc rose.
- amanite pantherina, i.e. panthère : chapeau brun à verrues blanches ; anneau membraneux non strié ; volve avec 1 à 2 bracelets ; chair blanche.
- amanite phalloïde
- amanite muscaria, i.e. tue-mouches.
- lactaire aurantiacus, i.e. orange.
- clitocybe dealbata, i.e. blanche ; spore ≈ blanche.
- volvaire gluante = volvariella gloiocephala : chapeau blanc gris ; lames blanches → rose → brun ; spore ≈ rose ; pied blanc à volve blanche ; ♀ anneau ; odeur de rave.
- leccaria amethystina.
- leccaria leccata : spore blanche.
- galère marginata.
- trichomolopsis rutilans.
- tubaria romagnesiana = tubaire de Romagnesi : chapeau rouge orangé, à marge striée ; lames ocre.
- pégize orangée = aleuria aurantia. Écomycètes.
- lactaire britanicus : rouge, à lait blanc. ≈ subsericatus
(= presque soyeux).
- lépiote felina i.e. féline : petite lépiote à squames brun foncé, anneau bordé de noir ; odeur de pélar-
ginium.

trompette des morts, i.e. craterellus cornucopioides.

cortinaire orichalceus : lames jaune olive.

lépiste inversa.

clitocybe nebularis, i.e. nébuleux (= lepista nebularis) : lames facilement détachables; chapeau gris beige; odeur peu agréable.

bolet chrysenteron, i.e. à chair jaune.

tricholome équestre, i.e. auratum.

tricholome orirubens, i.e. à marge rougissante : chapeau à fibrilles grises; odeur de farine.

tricholome sulfureum, i.e. soufre : odeur de gaz d'éclairage.

hydne repandum.

polypore stipticus i.e. astringent : blanc.

polypore

tramète

leotie lubrique = leotia lubrica.

clitopilus prunulus = clitopile petite prune, meunier; odeur de farine, et couleur.

mycena galopus, i.e. à lait blanc.

cortinaire dibaphus, i.e. à 2 couleurs : chapeau lilas, lames violettes; pied avec bulle marginé.

Réaction rose foncé à la potasse sur pied, mais non sur chapeau.

lactaire luridus i.e. blafard : chapeau gris brun, lames tachées de violet au froissement (sinon crème).

gymnopile penetrans = flammule pénétrante : chapeau ocre rouge, lames jaune pâle tachées de rouille.

verse-de-loup.

mycène pure.

mycène rose.

tricholome saponecum.

verse de loup nigrescens, i.e. noircissante.

clitocybe anisé, var. alba : odeur d'anis.

flammulina velutipes, i.e. collybie à pied velouté : chapeau jaune orange; sur bois mort dégénérant à belais (en sec).

tricholome portentosum, i.e. prétentieux : charbonnier, fibrilles gris noir, chair jaune à blessures.