

* 18/4/2009:

les champignons de printemps (hygrophores, collybies, ascomycètes...) à La Chapelle Geneste.

Hurtado

I Route de S^t Sauveur: arrêt à l'E, puis à l'O.



- Phellin de Martip, sur tronc de sapin. faux amadou.
- crottes de chevreuil: noires, ovales, petites.
- strobilurus esculentus = collybie des cônes d'épicéas. Forme brune → chapeau brun; forme blanche → chapeau blanc.
- strobilurus tenacellus = collybie à pied ferme, blanc, ocre et brun rouge, de haut en bas. Sur cône enfoui de pin (sylvestre).
- clitocybe pruinosa, avec "racines".
- myxomycete blanc: = "crachat de coucou".
- lypholome capnoïdes.
- caloscypha fulgens i.e. pezize brillante: coupe jaune orangé à l'int., pâte à l'ext. et se tachant de vert bronze.
- rastroemia elatina, brun olive, sur sapin. E ascomycètes.
- lachnellula subtilissima, en coupe jaune à l'int., à l'ext. blanche et hérissée de longs poils blancs. E ascomycètes.
- hygrophore de mars: peu visible car caché sous la mousse. blanc → gris noir à l'air; en groupes. = hygrophorus marguolus.
- aleuroditus amorphus, discoïde: rosé.
- polypore brunalis.



x3

→ repas autour du feu de cheminée au "village vacances" de Ch. Hurtado, à la Chapelle Geneste.

II Route de S^t Sauveur: à l'O. (à la borne)

- mycène striata, i.e. cespitense: en touffes sur souches de conifères; odeur de Tavel.
- lycopodon vieilli ++.
- discina perlata = discine perlée; = pyromitte.
- entoloma liripes, à odeur d'huitre. Lames roses. Pied "hérissé", avec feutrage blanc à la base. Spore brun rose, anguleuse, apiculée.
- hygrophore de mars.
- phaedus schweinitzii = phéole de Schweinitz: polypore à pores jaune → brun.
- mycène maculata: taches de "vieillesse" brun rouge; poils "aux pattes" i.e. à la base du pied.
- tramète du sapin = trichaptum abietinum; sur bois mort de sapin surtout. Marge violet clair.



Spore

- mycène galopus = à lait blanc.
- hydne scrobiculé = *Hydnum scrobiculatum*: brun roupe → noir.

III Route de St Alyre:



- mycène strobilicola, sur cône d'épicéa, pluri-pores i.e. avec base du pied garni de "plumes" i.e. "poils aux pattes"; lames blanches; odeur de Tavel; chapeau en cône.
- hygrophore de mars.
-

IV Route de Laval/Boulon:

→ hêtraie, à l'O; puis à l'E.



- diatrype disciformis = diatrype en forme de disque, sur écorce de hêtre.
- hypoxylon fragiforme.
- panoderme applanatum, i.e. lipsiense; décoloré.
- Tramète versicolor = *conolus versicolor*.
- ♦ poils flexueux de chevreuil + "hôtel", avec "litières et toilettes".
- pycnoporellus fulgens = polypore éclatant, jaune roux.
- hygrophore de mars.
- Trametes gibbosa = tramète bossue.



- champignon blanc, en tête d'épingle, à chapeau déprimé, entouré par longs poils blancs: sur faine de hêtre parasité par panoderme applanatum. = ?
⇒ dessin sur feuille jointe.

V Flore:

- luzule pilosa = luzule printanière; feuilles planes à longs poils blancs.
- goodyera rampante: épis secs, avec graines.
- cladonia coniocraea, sur bois mort. = lichen, au milieu des mousses.

Thalle vertical; gris vert; farineux



Thalle horizontal; pdes = spores vertes à revers blanchâtre.

- Hylocomium splendens: mousse.
- Fluidium tamariscinum: mousse.
- mousse: ?
- mousse recouvrant tronc d'arbre dressé. = ?


réceptacle
 -achnellula
 subtilissima-

jaune,
 en coupe,
 face inf.
 blanche,
 hérissée de
 longs poils
 blancs.



asqu
 ave
 as
 form
 x10

S:



sporangie globuleux,
 brun olive.

x3

ustroenia elatina.

minier



champignon en
 tête d'épingle,
 blanc à chapeau,
 déprimé, bordure
 par longs poils
 blancs.

x12




x4-10



→ sur faîne de
 hêtre parasité
 par ganoderme
 applanatum.

setes:



chair coriace
 périthèce
 avec ostioles. -- écorce
 soulevée.

x3

← sporangie en
 disque noir bombé,
 sur écorce de hêtre.

← branche
 de hêtre.

-- écorce recourbée.

type en forme de disque: