

* 24/7/2014 : Sortie mycologique à la Chapelle-Geneste et environs. RUE place de l'église, à 10h.

Chapelle-Geneste
I. Route de St-Sauveur

I Route de St-Sauveur, côté O :

- chemin faisant une boucle.
- clitocybe en entonnoir, i.e. gibba.
- lypholome fasciculare: en touffes.
- russule nigribasis: acrifolia; lames assez serrées; acret; chair blanche → rose à gris brun.
- mycène gelopus, i.e. à lait blanc.
- amanite muscaria = hue-mouches.
- russule nigricans = noirâtre : lames très espacées, épaisses; chair blanche → rouge → noir.
- gomphus clavatus, i.e. chanterelle violette, en masse.
- russule vesca, i.e. comestible : chapeau rose jambon, se rétractant à la marge; réaction orange au sulfate de Fe.
- lactaire necator = turpis : laitier plombé, à cheveux brun olive; lait blanc → jaune vert en séchant.
- paxille enroulé = involutus.
- coltrice pérenne.
- lycoperdon perlatum = vers de loup perlée.
- amanite rubescens = gommette.
- corticaire sanguin.
- russule améthyste = russula turci : chapeau beige lilas vert; pied blanc; odeur d'iode à la base du pied.
- lactaire piperatus, i.e. poivre; blanc; lames très serrées; lait blanc → jaune en séchant.
- russule puellaris, i.e. délicate : cheveux pourpre(ocre); → jaune à blessures.
- bolet bai = xerocomus bedini.
- Mycocybe platyphylla.
- cantharellus cibarius.
- fuligo septica = myxa jaune.
- russule cyanoxantha.
- tremelle gélatineuse = pseudolydnum gelatinosum, tremellodon gelatinosum.
- russule integra: chapeau brun jaune pourpre; pied blanc.
- russule violeipes, i.e. à pied violet : chapeau violet vert jaune.
- cudonia circinans = cudonie à chapeau enroulé.
- lécide ventricospora i.e. à spores ventrues : grottes spores, odeur de baudruche (caoutchouc) - gâté de papier huile.
- lécide astragalina, i.e. chardonnay : chapeau orange à abricot.
- ← - spatularia flava, i.e. spatulaire jaune var. alpestre: sporocarpe crème, pied beige.
- collybie distorta, i.e. torquée : chapeau brun roux, lames blanches serrées.
- lactaire tabidus, i.e. dépérissant: ocre orange.

9/10/2011

- Lactaire deterrimus, i.e. de l'épicée.
- corticinaire collinitus (= integerrimus) i.e. enduit : chapeau visqueux brun ocre.
- Lactaire glutinopallens (= albocarninus), i.e. pâle glutineux : chapeau rose beige, pâlichon.
- Lactaire boleensis i.e. à lait abondant : vachette ; chapeau brun roux, velouté ; odeur de hareng.
- Lactaire veloute, i.e. vellereus : chapeau blanc, velouté ; lames assez espacées ; pied blanc ; grande taille, à l'automne.
- Russule badia, i.e. très acre : chapeau cramoisi, pied blanc.
- bolet chrysenteron, i.e. à chair jaune ; pied + rouge.
- Ramaria pallida, i.e. clavaire pâle.
- Hypoxylon aig : "p." noirs.
- Russule mustelina, i.e. belette.
- Amanitopsis coryli : petite amanite sous noisetier.
- Lactaire aurantiacus (= aurantiofulvus), i.e. fauve orange : chapeau orange ; latex blanc.
- Lactaire pyrogalus, i.e. à lait brûlant : chapeau gris ocre(...), grisé ; latex blanc → vert, en séchant ; sous noisetier.
- amanite spissa, i.e. éfaïe.
- Cantharellus amethysteus : chapeau jaune à squames lilas.
- Cyathula cyathoides : sur tige d'angélique.
- Taxille atrohomentosa.
- psathyrelle de Bé Candolle, i.e. candolleana : chapeau beige blanc ; lames gris lilac → pourpre brun, à arête blanche ; pied blanc.
- entolome rhodopolium, forme nidorosum, i.e. nitreux.
- Lepista gilva, i.e. lépiste jaune pâle (= clitocybe) : chapeau crème ocre avec guttules ocre roux ; marge enroulée ; lames serrées, décurrentes.
- clitopile prunulus, i.e. petite prune (= meunier) : odeur de farine.
- Russule de Quélet, i.e. queletii : chapeau pourpré, lames blanc crème, pied rose carmin ; odeur de pomme ; sous épicéas.
- galère marginata.
- Satyre du chien, i.e. mutinus caninus : tête verte noir (orange rouge, sous gléba), pied blanc jaune ; odeur !
- Bolet subsappendiculatus : jaune.
- Mycène pure.
- Lecaria amethystina.
- lydnium repandum.
- Mycène aurantiomarginata, i.e. éléphante : ocre jaune.
- Collybie fusipes, i.e. à pied en fuseau : rousse. en touffes.
- Mycène istipata, i.e. cespitose : grise ; odeur de ravel.
- Pezize arvenensis ≈ badia (= bai) : sporophore brun pâle ; stipes ornés de verrues isolées.
- Ganoderme carnosum, i.e. charnu (carné) : sur soudures de sapin.

4/07/2014

- corticinaire paleaceus, i.e. pailleté.
- rickenella fibula, i.e. amphale fibule.
- lycogala epidendron: jeune, rouge.
- russule pseudo-raculi: chapeau jaune → gris avec l'âge.
- lactaire lignyotus, i.e. couleur de suie.
- amanite junquillea, i.e. juponille: chapeau ocre jaune à verrues blanches.
- calocère visqueuse: jaune orange. = calocera viscosa.
- russule amara, i.e. amère: chapeau violet pourpre; sous-pins
-

- goodyera repens, i.e. rampante: orchidée.
- Lichen: cladonia subulata.

II Entre la Chaize-Rieu et Arlanc: côté E (D906):

- départ 100m au-dessus du stationnement, côté E; chemin puis descente vers ruisseau à travers bois, et retour par chemin.
- lyophyllum rhopalopodium, i.e. à pied en mousse: chapeau ocre, consistance pneumatique; barde avec chromatomes pouvant être visibles.
 - russule illota, i.e. sordide: = russule foetens. chapeau ocre; lames crème blanc à drête bordée de ~ noir; odeur d'amande amère.
 - amanite crocea, i.e. jaune safrané: pas de reste de voile, pas d'anneau. voile épaisse, engainante.
 - boletus edulis = cèpe de Bordeaux.
 - bolet ferrugineux: chair blanche.
 - cantharellus subpruinatus, i.e. pruineuse roussissante.
 - lactaire trivialis: lait blanc → vert gris, en séchant.
 - mycène galopus var. leucogala: chapeau ~ noir, mais lait blanc à la cassure.
 - plutee cervinus.
 - russule ochroleuca i.e. ocre et blanche.
 - hydnellum ferrugineum: blanc avec g. rouges; → brun à marge claire; coriace; sous, conifères.
 - lactaire camphoratus, i.e. camphré: chapeau noux, lait blanc, odeur de chicorée.
 - + lactaire helvus, i.e. à odeur de chicorée: chapeau ocre rose, lait épueux. à sphaignes.
 - pseudocraterellus undulatus, i.e. chanterelle sinuée: chapeau brun jaune, marge ondulée et crispée; en groupes sous feuillus.
 - russule fageticola.
 - mycène en casque, i.e. galericulata: chapeau beige; sur souches de Feuillies.
 - russule solaire.
 - gomphide rose, i.e. rosens: chapeau rose carminé; lames blanches → gris; décurrentes; pied blanc; sous

4/07/2019 pin sylvestre.

- ← - stropharia sporigènes : sur bois.
- ← - stérées étagées sur pin : jaune brun. insignitum?
- hélblie citrine, i.e. bisporella citrina : jaune. sur
bois mort de Pinus, en forme de coupe ou de disque.
- stereum insignitum, i.e. remarquable : brun rouille.
- peziza bedie, i.e. baie.
- lycoperdon nigrescens, i.e. verse-de-loup noircissante :
aiguillons courts bruns → noir ; sp. dure : sporome
rose à leur place.
- clitocybe odora, i.e. anisé ; var. alba = cheveau bleu
odeur d'anis.
- tubaria confragosa, i.e. tubaire annelée : brun roux ; anneaux
à zone humide.
-

* lichen vert, avec petits carpophores : baeomyces roseus.

△ non déterminés:

- entolome
- lactaire
- russule rouge
- 2 autres russules
- hélblome
- zinocystes
- amanite blanche

Genre	Espèce	Num	
<i>Auriscalpium</i>	<i>vulgare</i>	L283	hydne cure oreilles: chapeau brun feutré inséré latéralement; aiguillons brun clair
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i>	1308	
<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	1681	
<i>Caloscypha</i>	<i>fulgens</i>	A097	pézize brillante
<i>Ciboria</i>	<i>rufofusca</i>	A147	pézize 2-4mm ,brune; mini stipe. Sur cône : écaille de sapin
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	L387	polypore marginé
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	L426	luisant: plus clair que carnosum; sur souches de feuillus
<i>Ganoderma</i>	<i>carnosum</i>	L426	charnu: brillant, foncé; sur souches de sapins
<i>Geastrum</i>	<i>quadrifidum</i>	L500	à 4 lanières: au pied d'épicéas. Partie fertile reposant sur 4 lanières au sol
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	L390	lenzite des clôtures;sur bois de conifères.lames serrées
<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	0249	
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	1288	en touffes sur les souches de feuillus et de conifères, lames à reflets verdâtres
<i>Lachnellula</i>	<i>subtilissima</i>	A235	en forme de coupe jaune,sur sapin. Les paraphyses dépassent les asques;spores elliptiques
<i>Micromphale</i>	<i>perforans</i>	0494	petite odeur de chou pourri; pied noir à sommet clair, sur aiguilles de conifères, surtout épicéas
<i>Mitrula</i>	<i>paludosa</i>	A139	mitrule des marais: stipe blanc à tête jaune en massue; sur débris végétaux en zone humide
<i>Rutstroemia</i>	<i>elatina</i>	A152	rustroémie: pézize brune, avec pied; sur sapin.
<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	0621	sur cône d'épicéa. Collybie des cônes d'épicéas
<i>Strobilurus</i>	<i>tenacellus</i>	0623	sur cône de pins
<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>	L360	tramète du sapin : en console étagée, ocre mauve

botanique

<i>Caltha</i>	<i>palustris</i>	Populage des marais
<i>Valeriana</i>	<i>dioica</i>	Valériane dioïque
<i>Cardamine</i>	<i>pratensis</i>	Cardamine des prés
<i>Myosotis</i>	<i>arvensis</i>	Myosotis des champs

