



sortie champignons à la Chapelle Geneste - 10h:
place de l'église. Repas en plein air au "village
vacances" de Ch. Hurtado. Puis découverte d'une
forêt humide entre St Germain l'Hermin et Fournols
à Pépoire, l'ap. midi.

I Route de St Sauveur: arrêt à l'E, puis à l'O.

10) Champignons:

- volvariella bombycina = volvaire soyeuse, à chapeau blanc soyeux. à l'état jeune.
- phallus impudicus (en "colonie").
- russula olivacea: réaction myrtille au phénol; marge ridée; réseau d'anastomoses entre lamelles; sporée jaunée; pied blanc → rose lilas. Odeur fruitée. Chapeau vert, brun, pourpre.
- russula integra: pied blanc. Forme: pourpre; laire.
- Mecolothie platyphylla.
- lactaire salmonicolor: sous sapins. Zoné d'orange rif.
- russula pseudo-raoulti: jaune pâle; pied dans H₂O.
- russula nigricans i.e. noircissante: blanc → brun → noir.
- amanite roupissante = rubescens. Golmoite.
- russula cyanoxantha: lamelles lardacées, fourchues vers pied.
- amanite porphyre: odeur de patate, de rave.
- russula chloroides i.e. verdâtre: lamelles blanches à reflet vert; lamellules; cerne vert pâle & collet; odeur de poisson (fruitée?)
- russula foellarii i.e. délicate: petite, fragile; chapeau pourpre, reflets jaunes & blessures.
- phellodon tomentosus = hydne avec aiguillons blancs → gris.
- hydnelium scrobiculatum, ou ferrugineum, i.e. hydne ferrugineux: exsude des ^{gouttes} rouges.
- lactaire piperatus i.e. poivré: lait blanc → jaune, en séchant.
 - lactaire pergamenus, i.e. parcheminé: lait blanc → vert-de-gris.
 - lactaire glaucescens: lait blanc → orange.
- corinaire rouille fauve: sous-genre dermocybe.
- scutellinia scutellata = pézize en bouclier: orange avec poils noirs & marge.
- thelephora sebacea: palmé. ≈ thelephore terrestre; ramilles; plaque blanchâtre → poudre de spores blanches; incruste brun.



20) Divers:

- œufs translucides, de 4-5mm de φ, & souche; ≡ perles. = œufs d'escarbot fraîchement pondus, & souche ⇒ éclosion petits escarbots avec ébauche coquille (I+12).
- orchidée: goodyera repens.

→ repas avec russula amara, à chapeau violet, sous pins.

II Entre S^t Germain et Fournols : Pépère:

1) Champignons:

- Lactaire tabidus, i.e. dépérissant : ocre orangé.
 - Lactaire trivialis, i.e. commun; pied vite creux, = "œuf à moëlle".
 - Gymnopilus lipuritiae = gymnopile à chair jaune. Chapeau brun rouge, lames jaunes. Sur débris de bois (de conifères).
 - Lactaire camphoratus: odeur de chicorée. Chapeau brun roux.
 - Tubaria confragosa = tubaire annelée, avec anneau brun par les spores; chapeau brun roux. Peu commun, sauf à S^t Germain!
 - Amanite fulva i.e. fauve: ~~à~~ anneau.
 - Inocybe nospipes i.e. à pied bulboux: extrémité inf. aplati en bulbe (napus = navet).
 - Russule betularum i.e. des bouleaux: chapeau blanc rose.
 - Cortinaire scutulatus \approx evernius, i.e. cortinaire abondant. Chapeau brun violet, corine blanchâtre.
 - Russula apuosa i.e. apueuse: chapeau rouge cuivre.
 - Russula decolorans, i.e. décolorante: chapeau \pm orangé; pied blanc \rightarrow gris à extrémité inf.
 - Russula claroflavus, i.e. jaune clair: chapeau jaune chrome.
 - Hypholome elongatum, i.e. à long pied: chapeau miel.
 - Pezize badia, i.e. baie.
 - Lactaire necator, turpis ou plumbeus, i.e. plombé: chapeau brun olive.
 - Fomitopsis pinicola = polypore marginé: amadouvier des pins.
 - Inocybe lanuginosa, i.e. laineux: chapeau brun.
- Forme bulbocystis:
- Amanite jonquilles, i.e. jonquille: chapeau jaune à verrues blanches.
 - Hypholome epixanthum, var. radicosum, i.e. Hypholome à disque jaune à pied longuement radicant; chapeau ocre jaune voilé de blanc.
 - Armillaire, sur souche: laquelle?
 - Inocybe acuta, i.e. aigu: chapeau pointu brun ocre.
 - Lactaire rufus, i.e. roux; lait blanc.
 - Boletus calopus.
 - Russule paludosa, i.e. palustre: chapeau cuivré.
 - Tylopilus felleus = bolet de fiel.
 - Lactaire lenyotus i.e. couleur de suie: chapeau brun ^{noir} velouté à lames blanches.
 - Gerronea chrysophyllum, i.e. clitocybe à lames jaune d'or; = chrysomphalina chrysophylla.
 - Cortinaire rubellus = speciosissimus, i.e. très joli: chapeau brun roux. spores rouille. Mortel.
 - Bolet subappendiculatus, i.e. subappendiculé: chapeau ocre fauve, tubes jaunes; pied jaune, massif.



pied radicant

*25/7/2008 : Sortie champignons à la Chapelle Gereste -
Entre St Germain et Fournols: Pépère -
→ fin de la liste.

20) Flore:

- sphaigne.
- mousse: plagiomnium undulatum (lieu très humide),
en forme de petit arbre.
- blechnum spicant, i.e. fougère.
- orchidée: néottie nid d'oiseau.
- (buxbaumia : mousse rare, non retrouvée). Capsule
asymétrique. Sur humus de sol forestier ac. et argileux.
- trèfle d'eau, i.e. menyanthes trifoliata.

30) Faune:

- ← - insecte: byrrhide pustuleux ♂ mousses; = coléoptère
en forme de graine, très convexe. ≈ brazier.
- copille blautée tachetée: œuf ≈ sem. → merle, ou grive.

II Tourbière de l'Eclache (vers Gelles): côté d.

- amanite rubescens.
- inocybe lanuginosa, i.e. laineux.
- russule pageticola.
- russule lejda.
- russule ochroleuca.
- russule claroflava: chapeau jaune. Coloration bleu de Prusse au fiac.
- laccaria laccata.
- lactaire pyropalus, i.e. à lait brûlant.
- lactaire ravidus: lait blanc → jaune (sur mouchoir).
- russule betularum: chapeau rose → blanc; marge cannelée; très fragile. Groupe des émétiques.
- amanite fulva, i.e. fauve.
- tramète gibbosa, i.e. bossue.
- polypore ^{leporal?}
- lactaire obscuratus, i.e. obscur: chapeau fauve à centre olivacé; petit.
- russule sphaerophila, i.e. des sphaignes: chapeau rose vineux à disque vert; marge cannelée - ^{répétée}.
- amanite excelsa: E spissa, mais plus élancée.
- cortinaire subtortus, i.e. à odeur de cuir de Russie.
- cortinaire ^{flabellus}.
- russule delicata, i.e. sans lait: chapeau blanc → crème.
- russule nigricans, i.e. noircissante: chair blanche → rouge → noir.
- cortinaire melicorius, i.e. à chair verte.
- sparassis crispa i.e. clavaire crépue, ô fins.