

* 25/7/2010: Sortie champignons à la Chapelle Geneste. 10h: place de l'église.

I Route de St Sauveur: arrêt à l'E

- amanite spissa, var. excelsa.
- boletus calopus.
- russule puelharis: jaunît o blessures.
- phallus impudicus: "œufs" avec "noixette" centrale à goût de radis.
- amanite jonquille i.e. pemmata, à marge striée sans anneaux; spore amyloïde (les amanites à spores amyloïde ont souvent une marge striée).
- marasme perforant = micromphale perforans: pied noir violacé à sommet plus clair; odeur de rave; sur aiguille d'épicéas...
- amanite porphyre: odeur de patate.
- lydne ferrugineum.
- boletus aestivalis = cèpe d'été; chair blanche sous cuticule. (= bolet des feuilles).
- strobilomyces strobilaceus.
- gomphus clavatus = chanterelle violette, en masse.
- chanterelle comestible = cibarius.
- amanite rubescens = golmothe.
- myxomycète jaune.
- lycogala epidendron: rose.
- tricholome nauseosum (caligatum), ou matsutake: délice des japonais.
- Mcollybie platyphylla: "racines" fibreuses.
- russule pseudo-raoulti.
- russule nigicans, i.e. noircissante.
- amanite umbrinolutea = amanitopsis fuscolivacea;
≈ " battarrae, i.e. à cerne sombre.
- clitocybe gibba = infundibuliformis, i.e. en entonnoir: ocre rose.
- lactaire volenus, i.e. à lait abondant, blanc; = vachotte.
- lactaire herbillonii ≈ lactaire velouté: blanc velouté; ≈ lactaire poivré mais lames espacées. lait blanc → jaune avec patate.
- russule azurea: chapeau gris acier "violet".
- russule peludora: large chapeau rouge.
- russule sub-foetens: chapeau ocre.
- russule cyanoxantha: forme à chapeau vert.
- amanite jaune safran: crocea.
- xerocomus ferrugineus, à chair blanche; ≈ chrysenteron, mais chair jaune clair.
- spatularia flavida var. alpestris: spathe crème.
- bolet sub-appendiculatus: chapeau brun ocre jaune, tubes jaunes; pied jaune, massif.
- (boletus calopus).

→ lichen: peltigera polydactyla (ou canina)

⇒ repas au gîte du Bois de Chelles (= "village vacances" de Ch. Hurtado).

II Forêt de Lamandrie: par Champvieille.

- tylopilus felinus = bolet de fiel. (gautier?)
- russule xerampelina, i.e. feuille morte: chapeau rouge pourpre.
- phellin de Harzig.
-
- myrtilles = mûres: +++
- retour, par Cistrières, à la Chapelle Geneste.

III Route de St Sauveur: côté d., à l'E; puis côté p., à l'O.

- russule acrifolia: chapeau brun brillant, lames très âcres, chair = douce.
 - lachaire poivré, à lames très serrées: blanc.
 - russule vesca, i.e. comestible: chapeau rose jambon; réaction orangée avec sulfate de Fe.
 - pompilus clavatus = chanterelle violette, en masse.
 - russule à chapeau rose, mat; chair fade. ?
 - ganoderme carnosum, i.e. charnu: sur souche de sapin.
 - cudonia circinans = cudonie à chapeau enroulé: ascomycète petit et toxique.
 - trémelle gélatineuse = pseudohydnum gelatinosum.
 - russule emetica var. silvestris, à chapeau rose pâle et odeur de coco. → 8^{ns}
 - polypore du bouleau.
 - polypore bai, i.e. durus (badius, picipes): pied entièrement noir, excentré.
≈ polypore variable, i.e. varius: pied à 1/2 noir (1/2 inf.).
 - théléphore palmata, violacé: odeur de chou.
 - polypore rubilant = hapalopilus rubilans. Sur tronc de feuillus, ... Chapeau ocre rouge (café et café au lait). Réaction fuchsia à la patate.
 - hydne strobilé.
 - collybie apuosa, beige ocre; pied bulbeux à la base.
≈ " dryophila. ≠ 0 lieux humides.
- achillée sternutatoire: 8^{des fleurs} fleurs blanches; feuilles pointues