


* 29/5/2011 :

Ise Brunneau
Bordelais

Bois du château de Torsiac (vallée de l'Allagnon).
R.V. 10h à la mairie de Torsiac, ap. Lanau,
perchée dans "le désert".... (A Lanau, pourt à d.,
puis tourner à g.: mini route longeant la rivière
puis grimpant dans le montagne).



I De la mairie de Torsiac à Lanau, puis direction Apchat:
→ pont non franchi: petite route longeant l'Allagnon.

- Onopordum acanthium: tige ailée épineuse, feuilles blanchâtres; gros capitule rose foncé; p^e de plante.
- gêne coronaria = coquelicarde des jardins: caryophylle à corolle rouge mauve, feuilles duvetueuses.
- hélianthème commun, i.e. nummularium, à fleurs jaunes.
- Rhum serpolet: Rhus pulagioides.
- mâhonia aquifolium, i.e. à feuilles de houx.
- aphorbe petit cyprès.
- Ligustrum vulgare = troène, en fleurs (→ odeur ++).
ou dris bouc.
- hellébore fétide: odeur désagréable.
- geranium robertianum = herbe à Robert.
- asplenium trichomanes = capillaire des murailles.
- polyode vulgare, i.e. commun.
- chaerophyllum hirsutum = cerfeuil hérissé. ≠ anthisque des bois (anthisque sylvestris).
- mâche = doucelte = valérianelle potagère: Valerianella locusta. ≠ espèces, d'ap. fruit.
- gaillet praterianum = Gaulium aparine: tiges accrochantes.
- lierre Perrenot = Glechoma hederacea.
- ombilic de Vénus, i.e. umbilicus rupestris: fleurs pendantes, en longue grappe.
- p^e de chelidoine, ou g^e d'éclaire, i.e. Chelidonium majus.
- ortie: en p^e quantité. ureux? dioïque?
- sureau noir, i.e. sumacca nigra: en fleurs (odorantes).
- bryone dioïque = Bryonia dioica.
- coquelicot (ou pavot) aouteux, i.e. Papaver dubium: latex blanc, pétales rose clair.
- sedum dasypetalum, i.e. orpin à feuilles épaiées: feuilles opposées, bombées en-dessous; fleurs blanc rose pâle.
- clématis vierge blanche = Clematis vitalba: herbe aux gueux.



- sedum rupestre (= reflexum), i.e. orpin réfléchi: fleurs jaunes, feuilles linéaires.
- soubarbe des toits = sempervivum tectorum: rosette en forme d'artichaut.
- asplenium septentrio-nale = doradille du N: feuilles très étroites.
- anarrhinum à feuilles de juponette, i.e. anarrhinum bellidifolium: grappe effilée et serrée de petites fleurs bleues, feuilles de la tige divisées en fines lanières; feuilles de la base en rosette, ovales, dentées. Rosette fixée au rocher. E scrophulariacées! Situation très escarpée => approche difficile!!!
- saponaire de Montpellier, i.e. saponaria ocymoides: caryophylle à fleurs roses.
- menthe à feuilles rondes, i.e. mentha suaveolens: feuilles et tiges blanches; odeur forte.
- valériane officinale = valeriana officinalis: "herbe aux draps".
- campanule à feuilles de pêcher = campanula persicifolia.
- asplenium adiantum-nigrum = doradille noire, cépillaire noir; pétiole brun noir, luisant.
- polyptala vulgaris, i.e. polyptale commun.
- primula veris, i.e. primevère officinale, ou coucou.
- mauve des bois (= g. de mauve), i.e. mélva sylvestris; feuilles peu découpées.
- épergne des murailles, i.e. hieracium murorum.
- lampsane commune, i.e. lapsana communis. latex blanc lors de blessure; forme à tige verte, et forme à tige marron violacé.
- stellaire holostée = stellaria holostea: spores jaunes.
- gaillardia mollugine, i.e. galium mollugo: caillé-lait blanc; fleurs blanches, petites.
- verge bleu foncé. lepucelle?
- raiponce en épis = phytuma spicatum: fleurs blanches (\pm vert).
- raiponce noire = phytuma nigrum: fleurs bleu violet.
- forçelle enracinée = hypochaeris radicata: tige nue et lisse; ligules jaunes.
- millepertuis. lepucelle?
- mélitte à feuilles de mélisse, i.e. melittis melissophyllum: g. fleurs blanc rose.
- ① - dryopteris filix-mas, i.e. fougère or: indusie réniforme circulaire.
- silene nocturna, i.e. silène feuille: panicule unilatérale; tige à poils glanduleux visqueux, pétales blancs, échancrés.
- bénédicta arvensis = bénédicte d'Auvergne: capitule pourpre au sommet de tige naissant à l'aisselle des feuilles de la rosette basale; feuilles entières; fleurs à 4 pétales soudés à la base.
+ bénédicta arvensis = bénédicte des champs: feuilles divisées en lobes pennés et étroits; ...

- peltigera canina.
- pulmonaire à larges feuilles i.e. pulmonaria affinis: taches blanc gris maculent feuilles de base; fleurs pourpre → violacé → bleu.
- + ↗ pulm. à feuilles sans tache: mollis; angustifolia.

II Retour à la mairie de Torniac:

- un chemin en sens inverse.
- mairie + église: dominent la vallée; vue sur le château de Léotoing.
- pique-nique sur parking ombragé de la mairie: bancs, oiseaux, odeur(!) des troènes, calme, beau temps.

III Bords de l'Auge:

- Retour route d'Apchat, puis chemin (côté O) longeant l'Auge.

10) Flore:

- sauge des prés = salvia pratensis.
- vipérine commune = echium vulgare.
- ornithogale des Pyrénées, i.e. ornithogalum pyrenaicum: grappe allongée de fleurs blanc vert, à 6 tépales.
- conopode dénudé i.e. conopodium majus: noisette de terre.
- laïtue scarole (=scarole), i.e. lactuca serriola: feuilles sup. orientées N.S.
- fougère aigle, i.e. pteridium aquilinum: longs rhizomes
- lindéne = verbascum: non fleurie. Hausse pluviale?
- gaillet croisette, i.e. cruciata laevipes: plante vert jaune à petites fleurs jaunes et odeur de miel.
- arméria arenaria = armérie desséchées (armérie faux plantain, armérie faux ail).
- cornouiller saignant, i.e. cornus sanguinea.
- salifis des prés = tragopogon pratensis.
- centaurée Ryndie
- ancolie commune, i.e. aquilegia vulgaris: fleurs bleu intense.
- prêle des champs, i.e. epipactis arvensis.
- cardamine hirsute, i.e. cardamine hirsuta.
- cardamine flexueuse, i.e. cardamine flexuosa.
- stellaire holostée parasitée par champignon ⇒ étamines couleur café (spores brunes) - jaune, normalement -.
- doronic à feuilles en cœur = doronic (-fardalianches): doronicum fardalianches: fleurs jaunes tue-pauvres
- lis martagon, i.e. lilium martagon: fleurs parasitées en bouton, laineuses.
- renouée historte, i.e. polygonum historta: épis de fleurs

blanches.

- colchique d'automne, i.e. *colchicum autumnale*: capsule entourée par lige (au printemps); fleur à l'automne.
- benoîte commune, i.e. *geum urbanum*.
- polystic à signes, i.e. *polystichum aculeatum*: industrie circulaire, face arrondie.
- geranium livide, i.e. *geranium phaeum*: fleurs "lie-de-vin".
- ortie puante = épinette des forêts, i.e. *stachys sylvatica*: odeur très désagréable.
- petite pimprenelle, i.e. *sanguisorba minor*.

- ← → - lypoxylon fuscum: petit coussinet noir, ± arrondi, sur le ^{bruy} sol, sous ^{noisetier} aubépine.
- coprin avec voile sur chapeau: sous aubépine. ^{bruy} sous ^{noisetier} aubépine, four déterminant.

2°) Faune :

- calopteryx virgo, i.e. *calopteryx virgo*: ♀, avec corps vert à extrémité fauve et ailes brunes. ♂ demoiselle?
- papillon 1/2 deuil, i.e. *melanargia galathea*. ^{selles?}
- nacré de la ronce, i.e. *brenthis daphne*.
- chenille jaune, avec 2 bandes latérales de pt noirs; ≈ 12 cm; \Rightarrow chryseline dans fourreau de soie blanche. \Rightarrow hyménoïde du cendre?
- coléoptère rouge \rightarrow bruit de "clacou"

IV Château de l'Étang:

- petite route avec fort dénivelé et tournants raides.
- cour du château.

- ceterach officinal, i.e. *ceterach officinarum*: face inf. des feuilles recouverte d'écaillles brillantes.
- asplenium ruta-muraria, i.e. rue des murailler: soies allongées et confluentes, avec industrie unilatérale.
- linaire cymbalaire, i.e. *cymbalaria muralis*: "ruine de Rome".
(- *esplenium trichomanes*).
(- *sedum dasypylleum*).
- latrée à fleurs blanches.