


* 12/9/2009: Sortie mycologique à vallée glaciaire du Fossat.

Parking au col du Chansert.



I Chemin de la Croix du Fossat et bois à l'O:

- scléroderme citrin : enveloppe épaisse et coriace, avec spores à l'int. (brun olive foncé).
- leccinum versipelle, i.e. bolet changeant.
- gyroporus cyanescens.
- bolet erythroporus.
- cantharellus amethysteus.
- polypore varius : bois mort de hêtre, surtout; pied = noir à sa partie inf.
- polypore étranglé = oligoporus stipticus : blanc.
- polypore faux-amadouier = phellin de Hartig.
- polypore
- amanite tue-mouches : l'ingestion de la cuticule améliorerait la vision des couleurs.
- amanite rubescens = gomotte.
- boletus calopus.
- xerocomus chrysenteron.
- boletus edulis = cèpe de Bordeaux.
- russule charbonnière = cyanoxantha.
- russule vesca = comestible : cheveau rose brun; réaction saumon au sulfate de Fe.
- russule mustelina : sous épicéas, en montagne.
- russule laurocerasi, var. fragrans, i.e. à odeur agréable : odeur d'amandes amères.
- russula turci : odeur d'iode à la base du pied ; cheveau lilas vinaux.
- russula lepidicolor, i.e. à couleur de lepida : cheveau brun roux.
- russule fellea, i.e. de fiel : odeur de compote de pomme ; sous hêtres surtout.
- russule fageticola, i.e. simétrique du hêtre.
- russule nigricans, i.e. noircissante : la chair rougit, puis noircit.
- russule integra.
- lactaire vellereus, i.e. velouté : lait blanc, abondant.
- " orange : salminicolor?
- collybie à pied radicant = oudmansiella radicata.
- Mcollybie platyphylla, i.e. collybie à lames larges.
- ganoderme carnosum i.e. charnu.

- mycène en cespue = *mycena galericulata*.
- laccaria amethystina.
- mycène pura : odeur de "jetate" crue. Toxique.
- marasme alliacens, i.e. à odeur d'ail.
- calocère visqueuse.
- pholiote astrogalina, i.e. chardouneret : chapeau orange → abricot.
- cortinaire = ?
- inocybe = ?
- gros leccaire = ?

II Petit sentier allant à Pierre/Haute et bois à l'E :

- dure montée...
- lactaire trivialis, i.e. commun : "à pied sans moëlle", car pied vite creux; à sphaignes, mycilles..
- lactaire représentaneus, i.e. spectaculaire ; jeune ore; méchuleux. Lait blanc → violet, à lames.
- leccinum scabrum, i.e. bolet rude, ou reboteux; sous bouleaux; var. bertauxii = bolet ramoneur, avec chapeau brun noir.
- cortinaire : base du pied bléue.
- russule caïpes, i.e. à pied creux : chapeau rose violacé; à lieux humides.
- tricholome saponaceum.
- bankera violascens.
- pholiote changeante = mutabilis, ou *leucoporus mutabilis*.
- lactaire délicieux : lait carotte.
- lactaire salmonicolor.
- chanterelle tubiformis.
- hydne ferrugineux = *hydnellum ferrugineum*.
- cortinaire camphoratus : odeur de boue.
- lactaire blennius.
- cortinaire bolaris.
- russule fellea.
- hydne répandum i.e. pied de mouton.
- polypore rouge cinabre i.e. *pynoporus cinnabarinus* : rouge orange.
- bolet bai i.e. *xerocomus badium*.
- lactaire rufus.
- amanite vaginata.
- bolet pivré i.e. *chalciporus piperatus* : brun jaune.
- cortinaire azuréus (var. d'anomalis), avec chapeau bleu violacé → brun.
- verce de loup, i.e. *Lycoperdon*.
- * baeomyces rufus = lichen avec apothécies imitant petits champignons (Job : chemin des Peux).